

VÆKST

2022 – uge 16

Bladrandbiller i ærter og hestebønner fra vækststart

I fremspiringsfasen og frem til at bælgssæden er ca. 10 cm høj, skal der holdes øje med angreb af bladrandbiller i bælgssæden. De tidligst etablerede marker spirer frem inden længe, og derfor skal der holdes et vågent øje med bladrandbiller, som skal bekæmpes med det samme, man ser de første gnav i bladpladerne (1 gnav pr. plante). Foruden at "sætte" bælgssæden i den vigtige tidlige vækstfase, gør billernes larver efterfølgende stor skade ved at gnave på bælgssædens kvælstof-fikserende rodknolde. Larvernes gnav på disse reducerer således bælgssædens kvælstofforsyning i resten af sæsonen og dermed udbyttet i både hkg og protein.



Billede 1 og 2. Bladrandbiller forårsager de karakteristiske "billetklip" i bladene. Her i hhv. ærter (til venstre) og hestebønner (til højre).



Billede 3. Larver af bladrandbiller, som her gnaver på de kvælstof-fikserende rodknolde og rødder i hestebønner.

Middelvalg ved behov for bekæmpelse:

Anvend 0,15-0,2 kg/ha Lamdex mod bladrandbiller. I ærter kan der også anvendes 0,15-0,2 l/ha Mavrik/Mavrik Vita mod bladrandbiller. Mavrik Vita må anvendes frem til 15/6-2022.