

Ukrudt på gårdspladser og udyrkede arealer

Hvor en kemisk løsning ønskes anvendt, kan midlerne i tabel 1 anbefales. Nedbrydning af ukrudtsmidler på gårdspladser og andre befæstede arealer sker normalt langsomt, og bindingen i jorden kan være ringe. Begræns derfor anvendelse af kemiske ukrudtsmidler på disse arealer og hold stor afstand til boringer og brønde. Bemærk også, at visse midler ikke må anvendes på befæstede arealer. Vær ligeledes opmærksom på jordvirkningen (= skadevirkningen på bl.a. haveplanters rodudløbere) af midler indeholdende diflufenican (Legacy).

Tabel 1. Midler og dosering til ukrudtsbekæmpelse på gårdspladser og udyrkede arealer

Middel	Dosis l/kg pr. ha = ml/g pr. 10 m ²	Dosis ml/g pr. 100 m ²	Bemærkning
Glyphosat ¹⁾ – f.eks. Roundup Power Max	1,5–3,0 kg	15-30 g	Nyfremspiret ukrudt og græsser bekæmpes med den laveste dosis. Veletableret tokimbladet ukrudt bekæmpes med den højeste dosis. Gentagen bekæmpelse er nødvendig. En række glyphosatmidler må anvendes på befæstede arealer - tjek altid etiketten før behandling. Uden langtidsvirkning. Maks. 3. beh. pr. sæson.
Pistol ukrudtsmiddel	3,1 l	31 ml	På fugtig overflade tidligt forår på nyfremspiret ukrudt. Undgå at ramme planter, der ikke ønskes bekæmpet. Indeholder diflufenican og glyphosat. Ved anvendelse af rygsprøjte anvendes 31 ml Pistol ukrudtsmiddel i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m ² . Maks. 1 behandling pr. år.
Logo + LogoOil	50-150 g + 0,66-2,0 l	0,5-1,5 g + 6,6-20 ml	Udsprøjtes på fremspiret ukrudt i god vækst. NB! Logo er ikke godkendt på befæstede arealer.
Ronstar Expert	0,33 kg	3,3 g	På fugtig jord på nyfremspiret ukrudt fra ca. 1. april. Undgå at ramme planter, der ikke ønskes bekæmpet. Indeholder diflufenican + iodosulfuron. Ved bekæmpelse af større ukrudt blandes med et glyphosat-produkt. Må ikke anvendes på arealer belagt med asfalt og beton. God langtidsvirkning, hvis "filmen" på jordoverfladen ikke brydes.

1) Andre godkendte glyphosat-midler kan også anvendes.