

VÆKST

2022 – uge 23


Tæger og cikader i kartofler

Tæger

Det er nu markerne skal tjekkes for tæger. Tæger bekæmpes ved randsprøjtning med 0,3 kg/ha Lamdex, når de første angreb ses. Derved undgår man kraftige angreb senere i sæsonen.

Cikader


De første registreringer har vist en begyndende stor indflyvning af cikader fra hen i uge 20 og ind i uge 21. Skadevirkningen af de indflyvende cikader er i sig selv begrænset, men det er meget vigtigt at de bekæmpes, så opformering begrænses. Fra begyndelsen af juli ses næste generation cikader på undersiden af bladene. Cikadenymferne lever af plantesaft, som de får ved at suge på bladene. Symptomerne af sugningen ses først som en gul/brun farvning af de nedre blade. I august/september fremskyndes derved nedvisningen, så tilvæksten stopper for tidligt. **Første bekæmpelse anbefales foretaget ca. 3-4 uger efter begyndende indflyvning.**



Indflyvning af cikader



cikadenymfer



Symptomer på sugning af cikadenymfer



For tidlig nedvisning pga. cikader

Bekæmpelse af cikader

Begyndende indflyvning af cikader i uge 20/21 betyder, at der skal behandles mod cikader senest i ugen op imod Sct. Hans (uge 25). Anvend 0,15-0,20 kg/ha Mospilan SG. Højeste dosis anvendes ved kraftige angreb og/eller i modtagelige sorter som f.eks. Saturna, Kardal og Oleva. For at sikre optimal virkning under alle forhold kan der med fordel tilsættes et additiv.

I stivelseskartofler kan der yderligere være behov for en behandling ca. 4 uger senere med 0,2-0,25 kg/ha Mospilan SG for at få så lang en virkningstid som muligt. Når insekt- og skimmelsprøjtning kombineres, anbefales det at blande med Ranman Top.