

## Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs og rødsvingel

Måltret bekæmpelsen mod de ukrudtsarter, som ikke kan frarenses græsfrøene, og som giver udbyttetab eller høstbesvær. Rapgræsser (enårig og alm.) er et alvorligt problem, fordi arterne påvirker kvaliteten i den høstede vare og ikke - eller kun vanskeligt - kan frarenses. Haremad og skræppe er vanskelige at frarenses i alle de storfrøede græsarter/sorter. Endelig skal de arter bekæmpes, som forekommer i så store mængder i marken, at der er risiko for direkte udbyttetab, høstbesvær eller kraftig forøgelse af frøpuljen i jorden.

## Tokimbladet ukrudt i foråret i rødsvingel og alm. rajgræs

Almindelig tokimbladet ukrudt bør bekæmpes tidligt forår, mens rodukrudt som skræpper, tidsler m.v. først kan bekæmpes senere i foråret i begyndende strækning under lune forhold med Ariane FG S (rødsvingel og alm. rajgræs) eller Mustang Forte (kun alm. rajgræs). Midlernes anbefalede dosis og temperaturkrav for god effekt ses i tabel 1.

**Tabel 1.** Oversigt over forskellige midlers effekter og temperaturkrav.

| Middel        | Dosering, ltr./ha | Temperaturkrav | Bemærkning                                                                                           | Godkendelse                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legacy        | 0,07-0,1          | Ved vækststart | God effekt på agerstedmoder, ærenpris og tvetand.                                                    | Mindre godkendelse i bl.a. etableret rajgræs og rødsvingel. 1 behandling pr. sæson.                                                          |
| Zypar         | 0,75-1,0 ltr.     | 2-3°C          | Bredeste effekt på alm. tokimbladet ukrudt samt storkenæb, lægejordrøg, tvetand, hundepersille m.fl. | Mindre godkendelse i st. 23-32 i bl.a. alm. rajgræs og rødsvingel udlagt i dæksæd. <b>Må ikke anvendes i udlæg i renbestand i efteråret.</b> |
| Primus XL     | 0,75-1,0 ltr.     | > 5°C          | Kræver bedre temperaturer end Zypar.                                                                 | Ordinær godkendt i frøgræs i st. 20-39. Anvendes alternativt Starane XL kræves højere temperaturer og en dosis på 1,5 l/ha.                  |
| Catch         | 0,6 ltr.          | >5°C           | Kræver bedre temperaturer end Zypar.                                                                 | Mindre godkendelse i st. 20-32 i bl.a. rajgræs og rødsvingel.                                                                                |
| Mustang Forte | 0,75-1,0 ltr.     | >10-12°C       | God effekt mod kamille, rodukrudt m.fl.                                                              | Mindre godkendelse og <b>kun i rajgræs i st. 30-32!</b>                                                                                      |
| Ariane FG S   | 2,5 ltr.          | >10-12°C       | God effekt mod rodukrudt.                                                                            | Ordinær godkendt i frøgræs i st. 21-31. 2,0-2,5 (1. årsmarker); 2,5-3,0 (flerårsmarker)                                                      |

## Græsukrudt i rødsvingel i foråret

Kemisk bekæmpelse af rapgræsser er desværre vanskelig og til tider umulig, og samtidig kan midlerne være hårde ved afgrøden.

## Bekæmpelse af enårig rapgræs med Hussar Plus OD i rødsvingel

Hussar Plus OD er godkendt til mindre anvendelse mod enårig rapgræs i rødsvingel i foråret, og anvendes bedst som opfølgning på en behandling med samme middel i efteråret, tidligst på små planter under lune forhold (>7-8°C). Problemet med enårig rapgræs i rødsvingel skal dog være stort, før en behandling iværksættes, da rødsvingel kan blive "sat" af en behandling, hvis det efterfølgende bliver tørt.

Er der anvendt 0,05 l/ha Hussar Plus OD i efteråret, kan der anvendes 0,05-0,09 l/ha Hussar Plus OD + 0,5 l/ha Olie i foråret. Er der ikke foretaget en behandling i efteråret, anvendes en splitstrategi i foråret med 2 x 0,07 l/ha Hussar Plus OD + 0,5 l/ha Olie, hvor første sprøjtning foretages hurtigst muligt, og den opfølgende behandling 2-3 uger senere. Hussar Plus OD skal altid tilsættes 0,5 l/ha Olie. Halm må ikke opfodres. Læs etikette før brug.

### **Bekæmpelse af agerrævehale, flyvehavre, kvik og vindaks i rødsvingel**

0,4-0,8 l/ha Agil 100 EC + 0,15 l/ha Spredeklæbemiddel *eller* 1,0-2,0 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash kan anvendes under gode temperaturforhold. Kvik bør bekæmpes, når det har 3-4 blade. Laveste dosis forhindrer kvikken i at sætte frø. Begge midler er godkendte til mindre anvendelse. Halm må ikke opfodres for Agil. De kan ikke blandes med vækstreguleringsmidler på grund af risiko for afgrødeskade. Max. 2 behandlinger pr. vækstsæson for Agil med samlet dosis efterår og forår på maks. 0,8 l/ha, og maks. 1 behandling pr. sæson for Focus Ultra.

### **Græsukrudt i alm. rajgræs i foråret**

#### **Bekæmpelse af alm. rapgræs, vindaks og flyvehavre i alm. rajgræs**

Primera Super er godkendt til mindre anvendelse mod ovenstående arter i alm. rajgræs. Midlet skal først anvendes ved begyndende strækning og under gode og lune vækstforhold (>10-12°C). Der skal anvendes 0,8-1,0 l/ha Primera Super + 0,2 l/ha Spredeklæbemiddel for god effekt. Halm må ikke opfodres. Læs etikette før brug.