

# VÆKST

2023 – uge 17

## Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner

Hestebønner er en åben afgrøde i begyndelsen af vækstsæsonen, som har en god konkurrenceevne mod ukrudt senere i sæsonen ved plantetal på 40-50 planter/m<sup>2</sup> jævnt fordelt i marken. Under afmodningen åbner afgrøden op igen og giver plads til genvækst af græsukrudt. Ved stor bestand af græsukrudt kan det betyde behov for nedvisning før høst. Den klart bedste ukrudtseffekt opnås ved anvendelse af glyphosat/Roundup PowerMax XL + jordmiddel før fremspiring af hestebønnerne, som efter behov følges op med Fighter 480 efter fremspiring under lune forhold.

### Efter såning men før fremspiring

Den anbefalede sådybde på 8-10 cm giver mulighed for at opnå en god ukrudtsbekæmpelse med glyphosat/Roundup PowerMax XL + jordmiddel. Dette sikres især ved at anvende Fenix som jordmiddel, da Fenix i lighed med glyphosat/Roundup PowerMax XL kan anvendes helt frem til hestebønnernes fremspiring. Dermed sikres en god bekæmpelse af hurtig fremspirende arter som f.eks. spildraps. Midlerne virker bedst på fugtig jord, men undgå sprøjtning ved udsigt til kraftig nedbør efter udbringning.

### Efter fremspiring

Fighter 480 anvendes efter fremspiring, hvis der bliver behov for opfølgning på anvendelse af jordmidler. Fighter er temperaturfølsom og kræver gode temperaturforhold. Desuden er det muligt at anvende Agil 100 EC eller Focus Ultra mod f.eks. agerrævehale og italiensk rajgræs, hvor sidstnævnte samtidig forebygger rajgræsresistens.

**Tabel 1. Anbefalede ukrudtsstrategier i hestebønner.**

| Ukrudt                                                                                                                                                                                    | Middel                                                                | Dosis pr. ha                  | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agersennep, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, korsblomstret ukrudt, natlimurt, raps, snerlepileurt, tvetand, ærenpris                      | <b>Inden bønnernes fremspiring:</b><br>Fenix<br>+ Roundup PowerMax XL | 0,75-1,5 ltr.<br>+ 1,0-1,5 kg | Lige før fremspiring. Bedst virkning på fugtig jord. Højeste dosis ved stor ukrudtsbestand. Effekt af glyphosat er betinget af, at ukrudt er spiret frem.                                                            |
| Agersennep, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, korsblomstret ukrudt, storkenæb. <i>Ved tilsætning af Stomp CS desuden effekt mod stedmoder, enårig rapgræs og hanekro</i> | <b>På ukrudt med 0-2 blade:</b><br>Fighter 480                        | 1,0 ltr.                      | Opfølgning på anvendelse af jordmiddel. Mindre anvendelse af Fighter 480. Max. én behandling med Fighter 480 pr. vækstsæson. <i>Der kan tilsættes 0,5-1,0 ltr./ha Stomp CS, som gør løsningen mere bredspektret.</i> |
| Agerrævehale, flyvehavre, kvik, rajgræs (forebyggelse af resistent rajgræs)                                                                                                               | Focus Ultra                                                           | 1,0 – 2,0 ltr.                | Når græsser har 2-3 blade. Kvik skal have 3-5 blade. Højeste dosis mod kvik. Max. én behandling pr. sæson.                                                                                                           |
| Agerrævehale, flyvehavre, kvik                                                                                                                                                            | Agil 100 EC                                                           | 0,5 - 0,93 ltr.               | Når græsser har 2-3 blade. Kvik skal have 3-5 blade. Højeste dosis mod kvik. Kun behandling hvert 2. år på samme areal.                                                                                              |