

VÆKST

2023 – uge 17

Ukrudtsbekæmpelse i markærter

Ukrudtet i ærter skal bekæmpes i en grad, så restukrudt ikke vil genere høsten, og man samtidig undgår opformering af ukrudt. Vær obs. på at glyphosat ikke må/kan anvendes i ærter til konsum, fremavlsærter og i ærter med udlæg. I ærter til foder kan glyphosat anvendes mod bundukrudt af f.eks. enårig rapgræs, som vil genere høsten.

Timing

Ukrudtet skal bekæmpes på kimbladstadiet uden hensyn til ærternes størrelse. Vanskelige arter som snerlepileurt, vejpileurt, raps og gul okseøje skal bekæmpes på ukrudtets kimbladstadiet. Hvis nyt ukrudt fremspirer senere i en mængde, der udløser behov for bekæmpelse, sprøjtes igen 7-10 dage senere. Det er optimalt med 15-20°C ved brug af Fighter 480, men i blandinger opnås god effekt, selvom temperaturen er lavere.

Bekæmpelse af ukrudt i ærter med udlæg af kløvergræs, rødsvingel og engrapgræs

I ærter med udlæg af græs/kløvergræs eller frøgræs er Fighter 480 og Stomp CS skånsomme. Hverken kløver- eller græsudlæg tåler Fenix. For at undgå, at Stomp påvirker udlægget, skal det sås, så frøene er dækket. I tabel 1 ses anbefalet løsning i ærter med udlæg.

Tabel 1. Anbefalet løsning til ukrudtsbekæmpelse i markærter med udlæg.

Ukrudt	Middel	Dosis pr. ha	Bemærkninger
Fuglegræs, gul okseøje, hvidmelet gåsefod, kamiller, pileurter, stedmoder, tvetand, ærenpris og korsblomstret ukrudt	1. sprøjtning på ukrudtets kimbladstadiet: Fighter 480 + Stomp CS	0,4 + 0,5 ltr.	Udlægget sås så frøene dækkes. Udlæg tåler den maksimale dosis af Stomp SC på 1 l/ha. Fighter må ved splitbehandling anvendes med maks. 0,9 l/ha i alt.
	Opfølgning 7-10 dage efter på nyfremspiret ukrudt: Fighter 480 + Stomp CS	0,5 + 0,5 ltr.	

Bekæmpelse af ukrudt i ærter uden udlæg

I tabel 2 ses vores anbefalede løsninger til ukrudtsbekæmpelse i ærter uden udlæg efter fremspiring. Ved stor ukrudtsbestand vil der være behov for at gennemføre en splitsprøjtning. Alternativt kan sprøjtes én gang med Fenix + Fighter 480, når ærterne er 4-5 cm høje.

Hvis det rette tidspunkt for en tidlig splitbehandling bliver forpasset, er øget dosis af Fenix + Fighter 480 den mest sikre løsning. En sprøjtning med Fenix + Fighter 480 kan også være aktuel, hvis fremspiringen af ukrudt på grund af tørre forhold efter såning sker over en lang periode. Det samme er tilfældet, hvis der er anvendt glyphosat og/eller jordmiddel (f.eks. Fenix) før fremspiring.

Tabel 2. Anbefalede løsninger til ukrudtsbekæmpelse i markærter uden udlæg efter fremspiring.

Ukrudt	Middel	Dosis pr. ha	Bemærkninger
Alm. tokimbladet ukrudt	<u>På ukrudtets kimbladstadiet:</u> Fenix + Fighter 480 <u>Opfølgning 7-10 dage efter på nyt ukrudt:</u> Fenix + Fighter 480	0,5 + 0,4 ltr. 0,5 + 0,5 ltr.	Fighter 480 må ved splitbehandling anvendes med maks. 0,9 l/ha.
Alm. tokimbladet ukrudt	<u>På ukrudt med 2-4 løvblade:</u> Fenix + Fighter 480	0,75-1,0 ltr. + 0,75-1,0 ltr.	Når ærterne er 4-5 cm høje. Lavest angivne dosis ved gode sprøjteforhold eller moderat ukrudtsbestand. Fighter 480 må ved enkeltbehandling anvendes med maks. 1,0 l/ha pr. år.
Burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, hvidmelet gåsefod, stedmoder, ærenpris, tvetand, sort natskygge, brandbæger, jordrøg, storkenæb , snerlepileurt, nogen effekt mod bleg- og ferskenpileurt og i mindre grad effekt mod raps og vejpileurt	<u>Når ærterne har ét løvblad:</u> Lentagran 45 WP + Fenix <u>Opfølgning 8-10 dage senere:</u> Lentagran 45 WP	0,5 kg + 0,35 ltr. 0,5 kg	Ukrudt med 0-2 blade når ærterne har et helt udfoldet første løvblad. Opfølgning efter behov ca. 10 dage senere.
Agerrævehale, alm. rapgræs, flyvehavre, hejre, rajgræs, vindaks	Agil 100 EC	0,5 - 0,75 ltr.	Laveste dosis mod nyfremspirede enårige græsser. Højeste dosis mod kvik, der skal hæmmes, så det ikke generer afgrøden. Kvik skal have 3-5 blade. Ikke effekt mod enårig rapgræs. Kun hvert 2. år på samme areal.
Agerrævehale, alm. hanespore, alm. rapgræs, flyvehavre, grøn skærmaks, hejre, rajgræs, vindaks	Focus Ultra + Dash	1,0 - 1,5 ltr. + 0,5 ltr.	Nyfremspirede enårige græsser med 1-2 blade. Ikke effekt mod enårig rapgræs. Max. 1 behandling pr. vækstsæson. Bedst effekt uden blanding med andre ukrudtsmidler.