

VÆKST

2023 – uge 18

Bladrandbiller i ærter og hestebønner fra vækststart

I fremspiringsfasen og frem til at bælg sæden er ca. 10 cm høj, skal der holdes øje med angreb af bladrandbiller i bælg sæden. De tidligst etablerede marker er spiret frem, og fra fremspiring skal der holdes et vågent øje med bladrandbiller, som skal bekæmpes med det samme, man ser de første gnav i bladpladerne (1 gnav pr. plante). Foruden at "sætte" bælg sæden i den vigtige tidlige vækstfase, gør billernes larver efterfølgende stor skade ved at gnave på bælg sædens kvælstof-fikserende rodknolde. Larvernes gnav på disse reducerer således bælg sædens kvælstofforsyning i resten af sæsonen og dermed udbyttet i både hkg og protein.



Billede 1 og 2. Bladrandbiller forårsager de karakteristiske "billetklip" i bladene. Her i hhv. ærter (til venstre) og hestebønner (til højre).



Billede 3. Larver af bladrandbiller, som her gnaver på de kvælstof-fikserende rodknolde og rødder i hestebønner.

Middelvalg ved behov for bekæmpelse:

Anvend 0,15 kg/ha Lamdex mod bladrandbiller. I ærter kan der også anvendes 0,15 l/ha Mavrik. På grund af hurtig tilvækst kan det blive nødvendigt at følge op en uges tid efter.