

VÆKST

2023 – uge 18

Ukrudtsbekæmpelse i vedvarende græs og kløvergræs

I ældre, varige marker, hvor der afgræsses, kan der være behov for en indsats mod ukrudt. Den mest effektive pleje består i, at der gennemføres et eller flere slæt eller afpudsninger, så græsset gennem hurtig genvækst bedre kan konkurrere mod lysesiv, mosebunke, brandbæger, tidsler, stor nælde og andre ukrudtsarter. De fleste varige græsmarker kan "rettes op" gennem intensiv pleje. Hvor afgræsning/slæt ikke er tilstrækkeligt, kan det være aktuelt at foretage kemisk eller mekanisk bekæmpelse. **Kemisk bekæmpelse er dog ikke muligt/tilladt på §3-arealer, brakarealer, 3 meters bræmmer og arealer med visse miljøtilsagn.**

Kemisk ukrudtsbekæmpelse i græs UDEN kløver

Tabel 1. Kemisk ukrudtsbekæmpelse i græs uden kløver – obs. dog ikke på §3-arealer og arealer med miljøtilsagn.

Ukrudtsarter	Tidspunkt	Middel	Dosis pr. ha.	Bemærkninger
Agertidsel, burresterre, engbrandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, ranunkel, skræppe, vårbrandbæger	April-maj	Ariane FG S	2,5 – 3,0 ltr.	Ved gode temperaturforhold. Max dosis i 2. og flerårsmarker er 3,0 l/ha. Når skud af skræppe er 15-20 cm. Behandlingsfrist: 30 dage. Må kun anvendes én gang om året.
Engbrandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, mælkebøtte, ranunkel, skræppe, vårbrandbæger	April-maj	Primus XL	0,75-1,0 ltr.	Når ukrudt er i god vækst. Mod skræpper og brandbæger anvendes 1,0 l/ha Primus XL. Behandlingsfrist: 7 dage.
Fuglegræs, mælkebøtte, skræppe, stor nælde	April-maj	Tomahawk 200 EC	1,4 - 1,8 ltr.	Når skud af skræppe er 15-20 cm og gode temperaturforhold. 1,8 l/ha mod brandbæger. Må kun anvendes én gang om året og senest 31. august. Behandlingsfrist: 7 dage.
Engbrandbæger, fuglegræs, hyrdetaske, ranunkel, røllike, skræppe, vårbrandbæger	Juli-august	Harmony 50 SX* + Spredeklæbemiddel	22,5 – 30 g + 0,2 ltr.	2-3 uger efter afpudsning eller afgræsning. Behandlingsfrist: 14 dage. Kan ikke anvendes forår. Må ikke anvendes senere end 31. august. Må kun anvendes én gang om året.
Vårbrandbæger	August	Harmony 50 SX* + Spredeklæbemiddel	15 - 22,5 g + 0,2 ltr.	Sidst i august, når vårbrandbæger er fremspiret. Behandlingsfrist: 14 dage. Kan ikke anvendes forår. Må ikke anvendes senere end 31. august. Må kun anvendes én gang om året.

*Harmony 50 SX kan også bruges i græs med kløver. Øvrige angivne løsninger i tabellen vil bekæmpe kløver.

Kemisk bekæmpelse i græs MED kløver

I foråret er der kun mulighed for at anvende Fighter 480, hvilket sjældent er aktuelt, da midlet kun har effekt mod få aktuelle arter i græs. I foråret hæmmer Harmony 50 SX græsvæksten meget. Derfor skal midlet anvendes i juli/august. Der sprøjtes på genvækst 2-3 uger efter afpudsning eller afgræsning. **Vår- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor planterne er små (engbrandbæger) henholdsvis**

nyfremspiret (vårbrandbæger). Midler, der kan anvendes i rent græs, kan også anvendes i græs med kløver, hvis man vælger at prioritere at få ryddet op i ukrudtet og accepterer, at kløveren sprøjtes bort.

Omlægning i sommerperioden

Hvis der er planlagt omlægning af et græs-/kløvergræsareal til nyt græs i sensommeren, bør skræpper og andet tokimbladet rod ukrudt bekæmpes effektivt i foråret uden hensyntagen til eventuel kløverbestand. Græsset kan derefter nedvisnes med et glyphosat-middel sidst i juli, hvorefter etablering af såbed og såning af græsfrø kan ske i august måned.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Følgende punkter indgår i plejen af en varig græsmark:

1. Afpuds eller tag første slæt før ukrudtet blomstrer. For bl.a. vårbrandbæger således i april-maj og for engbrandbæger i begyndelsen af juli.
2. Afpudsning gentages efter behov. F.eks. forsvinder lysesiv og flere andre ukrudtsarter ved gentagne afhugninger tæt på jordoverfladen. Ved gentagende afpudsninger bør man anvende modsat kørselsretning ved den næste afpudsning for at komme så tæt på bunden af siv som muligt. **Skræpper kan dog ikke bekæmpes mekanisk.**
3. En kombination af slæt og afgræsning er den bedste græsmarksdrift. Det giver et større udbytte og har bedre effekt mod ukrudt end afgræsning alene.
4. En meget intensiv afgræsning (mange dyr i en kort eller længere periode) eller en afpudsning med kort stubhøjde har en god effekt mod ukrudt.

OBS på vår- og engbrandbæger

Den sikreste bekæmpelse mod vårbrandbæger og engbrandbæger er at anvende Harmony 50 SX sidst i august.



Vårbrandbæger er enårig. Den fremspirer i sensommeren/om efteråret og blomstrer i april-maj året efter.



Engbrandbæger er to- til flerårig. Den fremspirer i foråret – her ses i midten engbrandbæger på rosetstadiet i foråret, mens den blomstrer i juli-august (til højre).

