


VÆKST

2023 – uge 19

Den afgørende svampebehandling i vinterbyg ved stakkens fremkomst

Vinterbygmarkerne er nu tæt på begyndende skridning/stakkens fremkomst, hvor den afgørende svampebehandling mod rust og bladplet bør foretages, uanset om der tidligere i strækningsfasen er foretaget en svampebehandling eller ej. I gennemsnit af 18 landsforsøg i 2019-2022 har to henholdsvis tre svampebehandlinger resulteret i et højere nettomerudbytte end en enkelt behandling. Netop ved stakkens fremkomst opnås samtidig den bedste forebyggelse af eventuelle senere angreb af ramularia. Risikoen for



Billede 1. Bygbladplet (nettypen).



Billede 2. Skoldplet.



Billede 3. Bygrust på de nedre blade.



Billede 4. Angreb af ramularia.

angreb af ramularia øges ved bladfugt, og hvis planterne er/har været stressede i det kolde forår og i mange tilfælde sene næringsstofoptag i år. Det er vanskeligt at forudsige, hvilke år ramularia for alvor indtræder, men forholdene har været/er der i år, og ramularia koster store udbyttetab.

Uanset sort – og uanset ramularia - vil der altid være god betaling for en svampebekæmpelse i vinterbyg ved begyndende skridning. En svampebekæmpelse på dette tidspunkt kan kombineres med en forebyggelse mod aksnedknækning med Cerone (især aktuelt i 6-radede sorter, herunder hybrider).

Tabel 1. Anbefalede løsninger mod svampe (bygrust, bygbladplet og skoldplet) og forebyggelse af ramularia i vinterbyg.

Strategi	Middel	Dosis pr. ha	Bemærkninger
Vinterbyg:			
Ved stakkens fremkomst/ begyndende skridning	Propulse SE 250 + Pictor Active + Spredeklæbemiddel	0,25-0,35 ltr. + 0,2-0,3 ltr. + 0,2 ltr.	Højest angivne dosis skal anvendes, hvis ønske om samtidig forebyggelse af ramularia.
	eller Propulse SE 250 + Comet Pro	0,3-0,45 ltr. + 0,2 ltr.	
Supplerende bekæmpelse efter fuld gennemskridning hvis bygrust	Orius Gold*	0,25 ltr.	Ved et evt. højt smittetryk af bygrust er der behov for en senere supplerende bekæmpelse på akset.
	eller Prosaro*	0,25 ltr.	

*Obs. på det samlede triazolregnskab i sæsonen, hvis højere dosis end angivet eller andre midler ved skridning.