


VÆKST

2023 – uge 19

Følg udviklingen af flyvning af fritfluer i sent sået havre

Havre i 1,5-3-bladstadiet er følsom for angreb ved samtidig flyvning af fritfluer og varmt og tørt vejr.

Tidspunktet for flyvning af 1. generation fritfluer kan følges via en graddagemodel, som kan følges via linket her: https://www.landbrugsinfo.dk/public/a/9/2/plantebeskyttelse_fritfluer_riskovurdering
Derved kan løbende følges nedenstående udvikling ved at indtaste postnummer for nærmeste lokalitet.



Bekæmpelse kan være aktuel i sent sået havre og evt. vårhvede. Graddage-modellen siger kun noget om forventet tidspunkt for forekomst af 1. generation fritfluer, men desværre ikke noget om angrebsstyrken. Eventuel bekæmpelse er aktuel, når kurven når op i det gule felt (70 graddage, begyndende flyvning).

Fritfluerne er især aktive og lægger mange æg, når det er varmt og tørt. De optimale betingelser er ved 20° C, mens 12 °C er minimum. Er planterne forbi 3-bladstadiet, når kurven når op i det gule område, er planterne ikke længere attraktive for æglægning.

Angreb ses hyppigst i havre, hvor bekæmpelse kan være aktuel ved overskridelse af temperatursummen, HVIS der samtidig er gode betingelser for flyvning af fritfluer (varmt og tørt vejr), OG havren er i 1,5-3-bladstadiet. I de øvrige afgrøder (vårhvede og majs) ses kun sjældent betydende angreb, og bekæmpelse anbefales ikke.

Ved angreb af fritfluens larve i havre bliver hjerteskuddene gule. Strækningsvæksten udebliver, og planterne får en lav vækst med mange sideskud. **Til bekæmpelse i havre kan anvendes 0,25 kg/ha Lamdex.**