


Roundup® Powermax

– med og uden additiver

Effektforsøg udført logaritmisk med Roundup Powermax XXL til nedvisning af 2. års rødsvingel med og uden additiver. Det ses tydeligt, at additiver nedsætter effekten af Roundup Powermax fra 0,5 kg/ha (360 g aktivstof).




Kilde: Forsøg udført af Agrolab 2021

Roundup® Powermax er identisk med Roundup® Powermax XXL, dvs. samme formulering og indhold af aktivstof.

Roundup®
POWERMAX XXL

Roundup®
Flex XXL


Tilsæt **IKKE**
additiver til
Roundup® Powermax XXL
og
Roundup® Flex XXL



Logaritme-forsøg i rødsvingel 2. års.
Se behandlingerne i figuren til venstre.
(Behandlet 20/4-2021, effekter 28/7-2021)



Forsøg med tilsætning af ammoniumsulfat og spredklæbemiddel til Roundup® Flex og Roundup® Powermax for at undersøge effekten på sprøjtevæskens pH-værdi.



Additiver har **ingen** effekt på sprøjtevæskens pH

Vandets pH-værdi 7,45 for tilsætning af Roundup og +/- additiver.


— Roundup® Powermax (720 g)
 — Roundup® Powermax (720 g) + AMS + spredklæbemiddel
 — Roundup® Flex (480 g)
 — Roundup® Flex (480 g) + AMS + spredklæbemiddel

Kilde: Forsøg udført af Agrolab 2022

Roundup® Powermax og Roundup® Flex er identisk med henholdsvis Roundup® Powermax XXL og Roundup® Flex XXL, dvs. samme formulering og indhold af aktivstof.

Unik formulering

sikrer, at alle nødvendige komponenter er en del af Roundup® Powermax XXL



Doseringsvejledning for Roundup® Powermax XXL og Roundup® Flex XXL

Anvendelsesområde	Roundup Powermax XXL (kg/ha)	Roundup Flex XXL (l/ha)
Før såning og efter såning før fremspiring	0,5-2,0	0,75-3,0
Pletsprøjtning i foderafgrøder mod rod ukrudt før høst	1,0-2,0	1,5-3,0
Pletsprøjtning i raps, lupin og hør mod rod ukrudt før høst	1,0-1,5	1,5-2,25
Stubmarker	0,5-3,0	0,75-3,0
– Bekæmpelse af kvik	1,5-3,0	2,25-3,0
– Bekæmpelse af nyfremspiret ukrudt	0,75	1,1
– Væselhale, gråbynke, agertidsler	2,5-3,0	3,75-3,0
Nedvisning efterafgrøder	1,5-2,0	2,25-3,0
Omlægning brakmarker og græsmarker	1,5-3,0	2,25-4,5
Udyrkede arealer (ved 1 behandling)	0,5-3,0	0,75-4,5
	(max 3,5 ved 3 behandlinger)	(max 7,5 ved 3 behandlinger)
Nedvisning af sennepsfrø	1,0-1,5	–

Antal behandlinger er 1 pr. vækstår, dog op til 3 behandlinger på frugtplantager, skov og udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. Læs altid etiketten inden anvendelse.



Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet for anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Roundup® er et varemærke ejet af Bayer.