

VÆKST

2024 – uge 20

Risiko for flyvning og angreb af bygfluer i vårbyg og vårhvede fra nu af

– sent såede marker er især udsatte

Sidste forår var mange vintersædsmarker landet over ramt af larveangreb efter flyvning/angreb af bygfluer om efteråret. I dette forår har vi heldigvis set færre symptomer på dette, men en stor risiko i år er til gengæld, at størstedelen af vårkornet er etableret sent, så kornet nu og i de næste uger er i et meget ømtåligt stadium samtidig med lunt vejr og dermed høj risiko for flyvning og angreb af bygfluer.



Billede 1. Angreb af bygfluer i vårhvede ses som deforme aks og meget uens strå længde med store udbyttestab til følge.

Bygfluer har to generationer om året. Efter en puppeperiode fremkommer i maj en ny generation af bygfluer, som kan angribe især sent sået vårbyg og vårhvede (og små sene sideskud i vintersæden) (bygfluer angriber ikke havre og gør størst skade på vårhvede frem til st. 37 (skader ses på billede 1)).


Fra nu af skal der landet over være stor opmærksomhed på at vurdere behovet og fastlægge tidspunktet for bekæmpelse af bygfluer især i vårhvede. Mod bygfluer kan anvendes 0,15 kg/ha Lamdex, som er godkendt til mindre anvendelse med op til 3 behandlinger og i alt 0,6 kg/ha. Da flyvningen kan strække sig over en længere periode, kan 2-3 behandlinger med 10-12 dages mellemrum være aktuel.

Graddageberegning			
Startdato	01-01-2024	Slutdato	31-12-2024
Basisværdi	4,5	Klimaændring	0,7
Tærskelværdi	300	Tærskeldato	15-05-2024
Beregn			
Århus N (8200)			
Temperatur og graddage med basistemperatur og korrektion for klimaændringer			
Dato	Lufttemperatur C	Graddage C	

For at sikre at man bekæmper fluerne rettidigt, anbefales at anvende værktøjet "Graddageberegner", som kan findes ved at indtaste – graddageberegner – i søgefeltet. Graddageberegner giver en indikation af, hvornår bygfluer forventes at flyve på egen lokalitet. Tast altid "4,5" ved basisværdi, "0,7" ved klimaændring,

"300" ved tærskelværdi og angiv så nærmeste bynavn. Tryk herefter på "Beregn" og brug "rullemenuen" ned i datoerne - med rødt vises datoen for begyndende flyvning på den angivne lokalitet. **Pt. giver graddageberegneren udtryk for, at flyvning netop er begyndt på lune og kystnære lokaliteter og fra pinsen af på køligere lokaliteter. Jo lunere vejr, jo hurtigere vil de begynde flyvning.**

Kig samtidig løbende efter bygfluer og deres æg i vårbyg- og vårhvedemarkerne – fluerne er 4-5 mm lange med gul ryg og 3 sorte striber og æggene er hvidlige (billede 2 og 3).



Billede 2 og 3. Den voksne blyflue (til venstre) henholdsvis dens æg (til højre).