Salling Grovvarer
Tlf. 97 57 60 88

Nordic Seed

VÅRSÆD 2027

— Stærkt sortiment af vårsæd



HØJTYDENDE OG STÆRKE VÅRSÆDSSORTER

Vi investerer i udviklingen af robuste, sunde og højtydende sorter, som er stabile over år uanset jordtype og lokalitet. Vores topsorter i alle arter kommer fra vores egen forædling, supporteret af stærke sorter fra udenlandske, anerkendte forædlere. Kort forbindelse mellem forædling og landbruget sikrer sorter, som til stadighed lever op til de øgede krav til kvalitet og dyrkningsegenskaber under danske forhold.

Fordele ved certificeret såsæd

- Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne.
- Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter samt ensartet fremspiring.
- Når såsæden er arts- og sortsren, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.
- Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdsningen. Certificeret økologisk udsæd er dog ikke bejdset.
- Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet osv. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
- Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, og forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræsudlæg).
- Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
- Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med denne ordning.

HUSK - STØT MÅLRETTET DANSK FORÆDLING

Nordic Seeds egne sorter er ensbetydende med dansk forædling, danske forsøgsfolk og danske fremavlere, og sorterne er specifikt fremavlet til at præstere under danske forhold. Ved at tilvælge Nordic Seed-sorter støtter I således arbejdet med i højere grad at forædle sorter, som er tilpasset danske forhold.

Nordic Seed har i dag 14 forædlingsprogrammer og vi kan således allerede præsentere et Vårsæds-program, som består næsten udelukkende af egne Nordic Seed-sorter. Dette er ikke kun fordi, de er danske, men fordi de er bedst.



FIND VEJENE TIL MERE DIVERSITET SELV NÅR VÅRSÆDEN DOMINERER

På mange bedrifter kommer man til at opleve, at sædskifterne bliver mere domineret af vårsæd.

For at begrænse opformeringen af sygdomme og ukrudt i de vårsædstunge sædskifter, er det vigtigt at man i tråd med de forebyggende IPM principper, tilvælger diversitet og robusthed, når man vælger afgrøder og sorter til markplanen.

Ved at øge diversiteten i sit afgrødevalg får man desuden bedre mulighed for at sprede arbejdsbyrden, så kapaciteten udnyttes bedst muligt på bedriften.

Gode råd til vårsædstunge sædskifter

Vælg nematoderesistente sorter for at vedligeholde sundheden i sædskiftet
Alle kornarter kan blive angrebet af nematoder. Angrebene er værst i vårafgrøder og særligt i havre kan det koste store tab i udbytte. Resistente sorter af havre og vårbyg stopper opformeringen af nematoder i jorden, og antallet af nematoder reduceres effektivt.

Tidlig høst med meget tidlig vårbyg
Tidlige sorter af vårbyg giver mulighed for at udnytte kapaciteten på bedriften bedre ved at få en tidligere høst i dele af vårbygarealet, og det giver plads til at etablere efterafgrøderne endnu tidligere. Markedets tidligste vårbygsort er nyheden NOS Aura fra Nordic Seed.

Havre sanerer og er konkurrencestærk
Havre er en god sanerende afgrøde, og det er den kornafgrøde med bedst konkurrenceevne overfor ukrudt. Havre er en god mulighed for mere diversitet i afgrødevalget. Her er det særligt vigtigt at vælge nematoderesistente sorter, især på de lette jorde.

Nye vårhvedesorter rykker på udbyttet, kvaliteten og sundheden
Vårhveden kan opnå et højt proteinindhold og er udover foder også velegnet til brødhvede. Nye sorter af vårhvede leverer et spring opad på udbyttet uden at gå på kompromis med kvaliteten og sundheden, hvilket gør vårhveden værd at overveje som alternativ til vårbyg.

Vælg en anerkendt og kvalitetssikker maltbygsort
Vårbyg kommer sandsynligvis til at fylde meget, og vil man dyrke maltbyg er det bedst at vælge en anerkendt og kvalitetssikker maltbygsort for at sikre afsætningen af afgrøden. De mest kvalitetssikre sorter er dem som har vist høj hektolitervægt og god sortering over flere år.

POULIDOR

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED

RESISTENT MOD NEMATODER

FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

SORTERING
Lav — Høj

BYGRUST
Lav m. — Modtagelig

BYGBLADPLET
Lav modtag. — Modtagelig

SKOLDPLET
Lav modtag. — Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING
Lav — Høj

AKSNEDKNÆKNING
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Nr. 1 i landsforsøg gns. 2025-2026
- Meget højt proteinudbytte
- Lavt merudbytte for svampebekæmpelse gns. over 3 år
- Dobbelt-nematoderesistent


NYHED

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKS-NEDKNÆKNING	STRÅ-NEDKNÆKNING	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning			
2026	102	67,3	10,8	880	97	0,1	4,0	3,0	1,6	7,0	0,3	8,0
2025	105	65,4	9,7	896	97	1,3	8,0	5,7	4,0	7,0	0,0	4,7
2024	109	63,7	10,7	780	94	1,3	2,8	2,0	1,0	2,0	0,8	15,0
GNS 2024-2026	105	65,5	10,4	852	96	0,9	4,9	3,6	2,2	5,3	0,4	9,2

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk.



Kilde: Sortinfo.dk.

NOS AURA

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED

RESISTENT MOD NEMATODER

FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

SORTERING
Lav — Høj

BYGRUST
Lav modtag. — Modtagelig

BYGBLADPLET
Lav m. — Modtagelig

SKOLDPLET
Lav modtag. — Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING
Lav — Høj

AKSNEDKNÆKNING
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Tidligste skridning i landsforsøg 2026
- Giver mulighed for meget tidlig høst og etablering af efterafgrøder
- Stærke stråegenskaber
- Dobbelt-nematoderesistent

NYHED

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKS-NEDKNÆKNING	STRÅ-NEDKNÆKNING	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning			
2026	99	67,6	10,9	862	95	0,0	2,3	1,5	10,0	3,5	0,0	8,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



KVALITETSSIKRE DANSKE MALTBYGSORTER

Den danske og europæiske maltindustri efterspørger højtydende maltbygsorter, som præsterer godt både dyrknings-, udbytte- og kvalitetsmæssigt. Vores sorter fra Nordic Seed er forædlet og udvalgt særligt til nordiske og europæiske forhold, og alle nye linjer bliver testet tidligt i forædlingsprocessen for deres kvalitetspotentiale til malt. Det sikrer, at kun de bedste sorter går videre.

Nordic Seeds egen maltbygsort Skyway er anerkendt og efterspurgt af danske og europæiske malterier og bryggerier. Med sit høje stabile udbytte og ensartede kvalitet på tværs af år og lande viser Skyway sig som et rigtig fornuftigt sortsvalg for landmænd, som både ønsker en dyrkningssikker og afsætningssikker maltbygsort.

Udbytteresultater

	SKYWAY	
DANMARK	2022-2026	100
	2026	98
SVERIGE	2022-2026	102
	2026	101
STORBRITANNIEN	2022-2026	102
	2026	102

*Sverige og Storbritannien er foreløbige data for 2026, da de endelige data først er blevet offentliggjort efter udgivelse.





Ingen øl uden byg. Så simpelt kan det siges.

Vil man forsikre sig på kvaliteten, så bør man som avler vælge en anerkendt maltbygsort med høj sortering og høj hektolitervægt.

Her har Skyway hele pakken, og det giver avlerne de bedste forudsætninger for at dyrke maltbyg med kvalitet i verdensklasse.

Ida Marie Garder
Produktudvikler og maltindustrikontaktperson hos Nordic Seed

SKYWAY

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED

RESISTENT MOD NEMATODER

MALT



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

SORTERING
Lav — Høj

BYGRUST
Lav modtag. — Modtagelig

BYGBLADPLET
Lav modtag. — Modtagelig

SKOLDPLET
Lav modtag. — Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING
Lav — Høj

AKSNEDKNÆKNING
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER


- Mest afsætningssikre danske maltsort
- Anerkendt af Heineken og Danish Preferred
- Top udbytter i England, Sverige, Baltikum og Danmark
- Højeste hektolitervægt i landsforsøg 2025 og 2026
- Dobbelt-nematoderesistent

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKS-NEDKNÆKNING	STRÅ-NEDKNÆKNING	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning			
2026	98	68,4	11,2	882	97	0,3	2,0	6,3	10,0	3,0	0,4	8,0
2025	100	66,4	9,4	829	96	1,4	2,0	4,3	18,0	0,8	0,0	3,7
2024	99	63,4	10,4	585	89	1,5	0,8	4,0	12,0	1,5	2,1	21,0
2023	100	66,5	11,8	694	97	0,9	2,0	4,3	23,0	-	0,0	13,0
GNS 2023-2026	99	66,2	10,7	809	95	1,0	1,7	4,7	16,0	1,3	0,6	12,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Kilde: Sortinfo.dk.

LAUREATE

VÅRBYG

FORÆDLER: RAGT

MALT



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

SORTERING
Lav — Høj

BYGRUST
Lav modtag. — Modtagelig

BYGBLADPLET
Lav m. — Modtagelig

SKOLDPLET
Lav modtag. — Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING
Lav — Høj

AKSNEDKNÆKNING
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Anerkendt sort til malt af europæiske maltere og Danish Preferred
- Lav modtagelighed for bygbladplet
- Modtagelig for nematoder

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKS-NEDKNÆKNING	STRÅ-NEDKNÆKNING	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht*	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning			
2026	97	66,6	11,2	872	95	0,6	2,7	3,0	3,9	1,2	0,0	8,0
2025	103	64,7	9,5	858	95	2,2	7,0	6,0	9,0	3,0	0,0	5,0
2024	102	62,3	10,6	612	90	1,9	3,0	3,4	5,0	1,0	0,0	8,0
GNS 2024-2026	100	64,5	10,4	781	93	1,5	4,2	4,1	6,0	1,7	0,0	7,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

NOS GAMBIT

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED

MALT FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

SORTERING
Lav — Høj

BYGRUST
Lav modtag. — Modtagelig

BYGBLADPLET
Lav m. — Modtagelig

SKOLDPLET
Lav modtag. — Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING
Lav — Høj

AKSNEDKNÆKNING
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER


- Højest ydende sort i landsforsøg gns. 5 og 6 år
- Godkendt af Danish Preferred
- Meget stærkt strå - velegnet til udlæg
- Lav karakter for aks- og stråknædknækning
- Lavt merudbytte for svampebekæmpelse
- God sortering

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKS-NEDKNÆKNING	STRÅ-NEDKNÆKNING	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning			
2026	99	67,2	11,3	894	97	0,0	1,7	2,0	8,0	1,4	0,0	15,0
2025	102	64,8	9,5	856	97	1,6	5,0	5,7	10,0	5,0	0,0	9,0
2024	104	62,3	10,9	643	90	1,0	1,3	1,0	11,0	0,1	0,1	23,0
2023	102	66,1	12,1	726	97	0,8	2,6	3,0	13,0	-	0,0	12,0
GNS 2023-2026	102	65,1	10,9	843	96	0,9	2,6	2,9	11,0	1,6	0,0	14,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Kilde: Sortinfo.dk.

NOS LOLLIPOP

VÅRBYG

FORÆDLER: NORDIC SEED

RESISTENT MOD NEMATODER | MALT | FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

SORTERING
Lav — Høj

BYGRUST
Lav modtag. — Modtagelig

BYGBLADPLET
Lav m. — Modtagelig

SKOLDPLET
Lav modtag. — Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING
Lav — Høj

AKSNEDKNÆKNING
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER


- Bedste sortering i landsforsøgene 2026
- Lavt merudbytte for svampebekæmpelse
- Ekstrem lav modtagelighed for bladplet
- Dobbelt-nematoderesistent

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKS-NEDKNÆKNING	STRÅ-NEDKNÆKNING	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning			
2026	97	97,1	11,1	867	97	0,3	2,3	3,3	6,0	1,3	0,0	5,0
2025	104	65,5	9,2	842	97	1,5	4,0	3,7	10,0	1,0	0,0	4,7
2024	104	63,2	10,3	717	95	1,6	2,3	2,6	12,0	2,2	0,0	18,0
2023	99	66,4	11,7	803	98	0,8	3,8	3,5	8,0	-	0,0	9,0
GNS 2023-2026	101	65,5	10,6	816	97	1,0	3,1	3,3	9,0	2,8	0,0	9,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Kilde: Sortinfo.dk.

LG CARUSO

VÅRBYG

FORÆDLER: LIMAGRAIN

RESISTENT MOD NEMATODER | FODER | MALT



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

SORTERING
Lav — Høj

BYGRUST
Lav m. — Modtagelig

BYGBLADPLET
Lav modtag. — Modtagelig

SKOLDPLET
Lav modtag. — Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING
Lav — Høj

AKSNEDKNÆKNING
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER


- Meget højtydende sort
- Laveste merudbytte for svampebekæmpelse som gns. over flere år
- Laveste karakter for både lejesæd, strå- og aksnedknækning som gns. over flere år
- Dobbelt-nematoderesistent

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*						OBSERVATIONSPARCELLER					
	KERNE-UDBYTTE	HEKTO-LITERVÆGT	RÅPROTEIN		SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	LEJESÆD	AKS-NEDKNÆKNING	STRÅ-NEDKNÆKNING	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	%	Karakter 0 - 10			% dækning			
2026	96	66,9	11,3	869	96	0,0	1,3	1,8	3,3	3,3	1,6	9,0
2025	104	66,0	9,6	877	97	0,8	2,0	3,7	5,0	1,0	1,3	3,0
2024	109	64,4	10,5	760	95	0,4	0,8	1,4	1,1	2,0	0,7	10,0
2023	99	65,9	12,1	859	97	0,7	2,0	2,3	0,2	-	0,0	3,0
GNS 2023-2026	102	65,8	10,9	844	96	0,5	1,5	2,3	2,4	1,6	0,9	6,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Kilde: Sortinfo.dk.

NOS ELITE MIX

FODER

NOS LOLLIPOP - BELTER - POULIDOR

FORÆDLER: NORDIC SEED OG SECOBRA



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

SORTERING
Lav — Høj

BYGRUST
Lav modtag. — Modtagelig

BYGBLADPLET
Lav m. — Modtagelig

SKOLDPLET
Lav modtag. — Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING
Lav — Høj

AKSNEDKNÆKNING
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Meget højtydende blanding
- Indeholder den nye topsort Poulidor
- Gode dyrkningsegenskaber
- Risikospredning i forhold til vækstsæsonens betingelser

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

Sorter**	UDBYTTEFORSØG*							
	KERNEUDBYTTE (FHT)		AKSNEDKNÆKNING		STRÅNEDKNÆKNING		MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE (HKG/HA)	
	2026	2024-2026	2026	2024-2026	2026	2024-2026	2026	2024-2026
NOS Lollipop	97	102	2,3	2,9	3,3	3,2	3,9	7,8
Belter	99	102	1,7	3,1	1,3	3,5	3,9	8,7
Poulidor	102	105	4,0	4,9	3,0	3,6	5,6	6,3
GNS. blanding	99	103	2,6	3,6	2,5	3,4	4,5	7,6

*Landsforsøg. **De tre sorter indgår med lige andele i blandingen.

Kilde: Sortinfo.dk

SORTSBLANDINGER – OGSÅ ET POPULÆRT OG STÆRKT VALG I VÅRBYG

Dyrkning af sortsblandinger øger afgrødens robusthed overfor bl.a. sygdomme sammenlignet med dyrkning af de rene sorter. I landsforsøgene 2026 var der et merudbytte på 1,4 hkg/ha i vårbyg ved at vælge en sortsblanding (måleblanding) sammenlignet med udbyttet af sorterne dyrket enkeltvis. Dette sammenholdt med de positive erfaringer fra praksis betyder, at dyrkning af sortsblandinger i korn for alvor er blevet udbredt i Danmark. En blanding af sorter påvirkes anderledes af stressfaktorer end de samme sorter dyrket hver for sig, og det stabiliserer udbyttet.

Til kommende sæson kan vi igen tilbyde tre stærke sortsblandinger i vårbyg til foder. De fem vårbygsorter som indgår i blandingerne er nøje udvalgt. Sorternes forskelligheder og styrker komplementerer hinanden godt og giver under de forskellige dyrkningsforhold en dynamik i blandingen, der øger afgrødens robusthed. Alle sorter i blandingerne er samtidig meget højtydende, og de har en lav sygdomsmodtagelighed. Vi kender ikke den kommende sæsons udfordringer i forhold til vejr, sygdomstryk m.m., men gennem valget af vores sortsblandinger er der fra vækststart lagt grobunden for en sikker og god avl.

NOS CONRAD

HAVRE

FORÆDLER: NORDIC SEED

RESISTENT MOD NEMATODER | KANDIDATGRYN | FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

HEKTOLITERVÆGT
Lav — Høj

MELDUG
Lav modtag. — Modtagelig

BLADPLET
Lav modtag. — Modtagelig

NEMATODER
Lav — Modtagelig

STRÅSTYRKE
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Ny dansk forædlet havre
- Nematode-resistent havresort med 5-6% højere udbytte end Dominik
- Højt proteinudbytte
- God sundhed
- God hektolitervægt

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2026	101	50,8	11,1	842	1,4	10,0	2,3
2025	99	51,5	10,9	943	0,7	10,0	2,1
2024	101	50,4	11,7	902	1,1	7,0	3,1
2023	101	49,1	12,6	910	0,0	13,0	3,0
GNS 2023-2026	100	50,5	11,6	899	0,8	10,0	2,6

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



JACKY

HAVRE

FORÆDLER: NORDSAAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT GMBH

GRYN FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

HEKTOLITERVÆGT
Lav — Høj

MELDUG
Lav m. — Modtagelig

BLADPLET
Lav modtag. — Modtagelig

NEMATODER
Lav — Modtagelig

STRÅSTYRKE
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Højt udbytte gns. over flere år
- Kan anvendes til gryn - kontakt din grovvareforretning
- Højeste hektolitervægt i landsforsøg gns. 2025-2026
- Bedste tolerance mod meldug
- Modtagelig for nematoder

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER	
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	BLADPLET
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	karakter 0 - 10	% dækning	
2026	102	53,3	11,2	858	1,3	0,0	2,2
2025	101	54,8	10,8	957	0,5	0,0	3,9
2024	101	52,1	11,4	880	0,4	0,0	3,2
2023	100	50,5	12,7	905	0,0	0,1	3,2
GNS 2023-2026	101	52,7	11,5	900	0,5	0,0	3,1

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

NOS SOUL

VÅRHVEDE

FORÆDLER: NORDIC SEED

BRØD FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

RÅPROTEIN
Lav — Høj

MELDUG
Lav m. — Modtagelig

SEPTORIA
Lav m. — Modtagelig

GULRUST
Lav m. — Modtagelig

STRÅSTYRKE
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Markedets højest ydende sort gns. 2025-2026
- Højeste proteinindhold i landsforsøg gns. 2025-2026
- Kan anvendes som brødhvede - kontakt din grovvareforretning
- Meget lav modtagelighed for alle sygdomme
- Længste strå i landsforsøg, men stadig høj stråstyrke


NYHED

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*				OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN	LEJESÆD	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	fht	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0 - 10	% dækning	
2026	107	78,3	13,7	953	0,0	0,8	-
2025	112	80,1	11,5	984	0,0	2,3	-
GNS 2025-2026	109	79,2	12,6	978	0,0	1,6	-

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Kilde: Sortinfo.dk.

NOS FRIGG

VÅRHVEDE

FORÆDLER: NORDIC SEED

BRØD FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

RÅPROTEIN
Lav — Høj

MELDUG
Lav modtag. — Modtagelig

SEPTORIA
Lav modtag. — Modtagelig

GULRUST
Lav m. — Modtagelig

STRÅSTYRKE
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Meget højtydende sort
- Kan anvendes til brødhvede - kontakt din grovvareforretning
- Høj stråstyrke
- Lav modtagelighed for gulrust
- Høj konkurrenceevne mod ukrudt

FAKTA - ØKOLOGISK AFPRØVNING

År	UDBYTTEFORSØG*					OBSERVATIONSPARCELLER		
	KERNEUDBYTTE	HEKTOLITERVÆGT	RÅPROTEIN		LEJESÆD	MELDUG	SEPTORIA	GULRUST
	hkg/ha	kg/hl	% ts	kg/ha	Karakter 0 - 10	% dækning		
2025	46,2	72,8	11,7	575	0,0	1,0	4,7	1,0
2024**	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	47,1	74,9	10,6	499	0,8	2,0	9,0	0,0
GNS 2023-2025	53,9	73,8	11,1	534	0,4	1,5	7,0	0,5

*Økologisk landsforsøg. **NOS Frigg har ikke indgået i sortsforsøgene 2024.
*** Udbyttedata fra 2026 var ikke klar ved udgivelse.

Kilde: Sortinfo.dk

BICROSS

VEKSELTRITICALE FORÆDLER: LEMAIRE DEFFONTAINES S.A.S.

FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

GULRUST
Lav m. — Modtagelig

SEPTORIA
Lav modtag. — Modtagelig

MELDUG
Lav modtag. — Modtagelig

STRÅSTYRKE
Lav — Høj

MODNINGSTID
Tidlig — Sen

ETABLERINGSTIDSPUNKT
1/3 — 1/5

EGENSKABER:

- Godt alternativ ved behov for meget vårsæd
- Stærkt valg til opfodring med mere protein og mindre meldrøjer end vårrug
- Velegnet på alle jordtyper
- Stærk konkurrenceevne mod ukrudt
- Lav modtagelighed for sygdomme og resistens mod gulrust
- OBS på bygfluer

Dyrkningsvejleding for vekseltriticale

Dyrkning af vekseltriticalen, Bicross, er et stærkt alternativ til foder i sædskifter med behov for meget vårsæd, og i marker med udfordringer med græsukrudt som følge af afgrødens stærke konkurrenceevne.

Såtidspunkt:
Jo tidligere vårtriticalen kan etableres i et godt såbed i foråret, jo højere udbyttepotentiale, jo tidligere modning og jo lavere risiko for angreb af bygfluen og dens larver.

Bicross etableret sent efterår (november) kan øger udbyttepotentialet, giver tidligere modning og minimerer risikoen for angreb af bygfluer.

Udsædsmængde og sådybde:
350–400 planter pr. m² med flest planter ved etablering efterår og sent forår.

Afhængigt af tusindkornsvægten (TKV) typisk på 190–220 kg pr. ha.

Gødskning:
Anbefalet kvælstofmængde ligger på cirka 110 kg til 130 kg N/ha med højeste mængde på vandet jord og ved tidlig såning/sen efterårsetablering. Fosfor, kalium og svovl ligesom øvrigt vårkorn.

Planteværn:
Alle produkter godkendt til triticale og/eller vårkorn er godkendt til anvendelse i vekseltriticale. Afgrøden har en kraftig vækst i foråret og dermed en god konkurrenceevne overfor ukrudt. Bicross har en lav modtagelighed mod sygdomme og er resistent mod gulrust.

NOS KARMA

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED

KONSUM FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav – Høj

RÅPROTEIN
Lav – Høj

STÆNGELSTYRKE
Lav – Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST
Lav – Høj

MODNING
Tidlig – Sen

EGENSKABER


- Højest ydende sort i landsforsøg 2026
- Halvbladløs med gule frø
- Lav modtagelighed for ærteskimmel
- Meget god stængelstyrke
- Kontakt din grovvareforretning for at høre om muligheder for kontraktavl

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR***	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2026	109	21,6	288	99	2,3
2024*	119	22,5	228	80	2,5
2023**	115	21,9	266	69	2,6
2022**	106	22,9	280	95	1,9
GNS 2022-2026	112	22,2	265	86	2,3

*Landsforsøg. **Værdiafprøvning. ***NOS Karma har ikke indgået i landsforsøg 2025.

Kilde: Sortinfo.dk



Kilde: Sortinfo.dk.

NOS IMPACT

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED

FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

RÅPROTEIN
Lav — Høj

STÆNGELSTYRKE
Lav — Høj

AFGRØDEHØJDE VED HØST
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Anden højest ydende sort i landsforsøg 2026
- Halvbladløs med gule frø
- God stængelstyrke
- Højeste afgrødehøjde af markedets ærtesorter til høst gns. flere år
- Kontakt din grovvareforretning for at høre om muligheder for kontraktavl

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2026	108	21,7	298	99	3,3
2025	103	21,1	288	86	4,2
2024	111	23,3	211	86	2,7
2023	102	21,0	264	52	2,3
GNS 2023-2026	106	21,7	265	81	3,1

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

NOS ZILO

MARKÆRT

FORÆDLER: NORDIC SEED

HELSÆD



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav — Høj

RÅPROTEIN

Lav — Høj

TKV

Lav — Høj

STÆNGELSTYRKE

Lav — Høj

MODNING

Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Ny topsort til helsæd
- 6% højere udbytte
- Højere foderværdi
- 6% højere proteinudbytte
- Markant højere fordøjelighed

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING TIL HELSÆD

2025	UDBYTTEFORSØG*				
	TØRSTOF-UDBYTTE	PROTEIN-UDBYTTE	FK NDF	FK ORGANISK STOF	AFGRØDEHØJDE VED HØST
	fht	fht	%	%	cm
NOS Zilo	106	106	59,3	77,0	69
Javlo	100	100	55,2	75,3	63

*Værdiafprøvning.

Kilde: TystofteFonden

LYNX

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT

FODER



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav — Høj

RÅPROTEIN

Lav — Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. — Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. — Modtagelig

VIKKESKIMMEL

Lav modtag. — Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav — Høj

MODNING

Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Anerkendt sort gennem flere år
- Lav modtagelighed for vikkeskimmel
- Høj stængelstyrke
- Middeltidlig til sen modning

FAKTA - KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR**	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2025	99	28,3	562	136	0,1
2024	97	29,4	526	141	1,1
2023	101	28,4	475	79	0,3
2022	107	29,0	542	115	0,3
GNS 2022-2025	101	28,8	504	118	0,4

*Landsforsøg. **Lynx har ikke deltaget i landsforsøg 2026.

Kilde: Sortinfo.dk

KETU

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT

KONSUM FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

RÅPROTEIN
Lav — Høj

CHOKOLADEPLET
Lav modtag. — Modtagelig

BLADPLET
Lav modtag. — Modtagelig

VIKKESKIMMEL
Lav modtag. — Modtagelig

STÆNGELSTYRKE
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Højtydende sort over flere år
- Højeste proteinindhold flere år i træk
- Høj stængelstyrke
- Tidlig modning
- Lavt indhold af vicin og convicin - velegnet til konsum


NYHED

FAKTA

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2026	97	29,3	565	127	0,0
2025	100	30,7	558	127	0,0
2024	105	31,3	467	142	1,3
2023	111	30,2	513	79	0,3
GNS 2023-2026	103	30,4	526	119	0,4

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Kilde: Sortinfo.dk.

NOS RONJA

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NORDIC SEED

FODER



UDBYTTEPOTENTIALE
Lav — Høj

RÅPROTEIN
Lav — Høj

CHOKOLADEPLET
Lav modtag. — Modtagelig

BLADPLET
Lav modtag. — Modtagelig

VIKKESKIMMEL
Lav modtag. — Modtagelig

STÆNGELSTYRKE
Lav — Høj

MODNING
Tidlig — Sen

EGENSKABER

- Nordens bedste hestebønnesort er dansk
- Højest ydende sort i landsforsøgene 2 år i træk
- Høj stængelstyrke
- Højt proteinindhold
- Tidlig modning


NYHED

FAKTA

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% ts	g	cm	karakter 0 - 10
2026	102	27,3	639	128	0,0
2025	104	28,5	584	123	0,0
GNS 2025-2026	103	27,9	611	125	0,0

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk



Kilde: Sortinfo.dk.

UDSÆDSMÆNGDER

ANBEFALEDE PLANTETAL OG SÅDYBDER I DE FORSKELLIGE VÅRSÆDSARTER			
ART	TKV INTERVAL	ANBEFALET PLANTETAL, PL/M² *	ANBEFALET SÅDYBDE, CM **
VÅRBYG, MALT	40-55	250-300	3-4
VÅRBYG, FODER	40-55	275-325	3-4
HAVRE	40-50	275-325	3-4
VÅRHVEDE	45-60	375-425	3-4
VÅRRAPS	-	50-60	2
HESTEBØNNER ***	400-600	40-50	8-10
MARKÆRT ***	250-350	50-70	6-8

*) Ved undersåning af græsfrø og kløvergræs bør udsædsmængden reduceres med 10-15%. Det samme er tilfældet ved god næringsværdi i jorden. Lavest angivne plantetal anvendes ultimo marts. Højst angivne plantetal ultimo april.
**) For dyb og uensartet såning resulterer i svage blege planter og koster nemt 2-3 hkg/ha i udbyttetab i vårkorn.
***) Ved højt ukrudtstryk anbefales altid højst angivne plantetal og samtidig dyb såning i bælgsæd, da dyb såning også kan være med til at sikre tilstrækkelig fugt til ensartet fremvækst.

Forventet markspiring

Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbeddets karakter, når den forventede markspiringsprocent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har "Farmtest med etablering af vårsæd" vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som følge af varierende sådybde og dårligt såbed.

Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90% markspiring, mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring. Markspiringsprocenten bør således fastsættes i intervallet 75-90% afhængig af såbedsforholdene, og det har stor betydning for den optimale udsædsmængde.

$$\frac{\text{Tusindkornsvægt x ønsket plantetal (pl/m}^2\text{)}}{\text{Forventet markspiringsprocent}} = \text{Kg udsæd pr. ha}$$

